

KLİNİSYEN TARAFINDAN ÖLÇÜLEN OTİZM SPEKTRUM VE SOSYAL İLETİŞİM BOZUKLUKLARI ŞİDDETİ

Yönergeler:

Klinisyen tarafından ölçülen şiddet ölçeği

- Sosyal iletişim probleminin
- Sınırlı ilgi ve yineleyici davranışlarının sonucu olarak işlevsellikte kısıtlılık ve destek gereksinimi düzeyini değerlendirmek için kullanılır.

Kişinin bakım almak için başvurduğu tanısını seçiniz:

- Otizm Spektrum Bozukluğu
- Toplumsal İletişim Bozukluğu

Kişinin aldığı tedaviye dair olan tüm bilgileriniz ve sizin klinik görüşünüzü temel alarak lütfen bireyin **son 7 gün içindeki** sosyal iletişim problemlerini ve sınırlı ilgi ve yineleyici davranışlarını puanlayınız.

	Düzyey 0	Düzyey 1	Düzyey 2	Düzyey 3
SOSYAL İLETİŞİM: Bireydeki toplumsal iletişimdeki eksikliklerin sonucu ortaya çıkan işlevsellik engellerinin ve destek gereksiniminin düzeyini puanlayın.	Hiç	İlimlı Destek Gerektirir (Yani, ortamda destek olmadığında toplumsal iletişimde fark edilir zayıflık. Sosyal etkileşimleri başlatmada güçlük ve başkalarından gelen sosyal tekliflere açıkça beklenenin dışında veya başarısız karşılık verir. Sosyal etkileşimlerde azalmış ilgi gözlenir.)	Orta Önemli Destek Gerektirir (Yani, sözel ve sözel olmayan toplumsal iletişim becerilerinde belirgin eksiklikler; desteğe rağmen fark edilir toplumsal iletişim kusurları; sosyal etkileşimi başlatmada kısıtlılık ve başkalarından gelen sosyal tekliflere olağandışı veya azalmış karşılık verme.)	Ciddi Çok Önemli Destek Gerektirir (Yani, özel ve sözel olmayan toplumsal iletişim becerilerindeki şiddetli eksiklikler işlevsellikte ciddi bozulmaya neden olur; sosyal etkileşimi başlatmada çok kısıtlılık ve başkalarından gelen sosyal tekliflere çok az karşılık verme.)
KISITLI İLGİLER VE YİNELEYİCİ DAVRANIŞLAR: Bireydeki kısıtlı ilgi ve yineleyici davranışların sonucu olarak işlevsellik engellerinin ve destek gereksiniminin düzeyini puanlayın.	Hiç	İlimlı Destek Gerektirir (Yani, ritüeller ve yineleyici davranışlar [RYD] bir veya daha fazla bağlamda işlevselliğe belirgin olarak engel olur. Başkaları tarafından RYD'yi engellemek ya da belli alandaki sabit ilgiyi başka alana yönlendirmek için yapılan girişimlere direnir.)	Orta Önemli Destek Gerektirir (Yani, RYD ve/veya uğraşlar ve/veya belli alandaki sabit ilgiler sıradan bir gözlemci tarafından fark edilecek kadar sıklıkta açıktır ve bir çok bağlamda işlevselliğe engel olur. RYD engellendiğinde sıkıntı veya huzursuzlanma gözlemlenir; belli alandaki sabit ilgiden dikkati çekmek zordur.)	Ciddi Çok Önemli Destek Gerektirir Yani, uğraşlar, belli alandaki sabit ilgiler ve/veya yineleyici davranışlar her alanda işlevselliğe belirgin olarak engel olur. Ritüeller veya rutinler engellendiğinde belirgin sıkıntı oluşur; belli alandaki sabit ilgiyi başka alana yönlendirmek çok zordur ya da hızla eski durumuna geri döner.)

DSM-5 Klinisyen Tarafından Puanlanan Otizm Spektrum ve Toplumsal İletişim Bozukluğu Şiddeti Ölçeği

Klinisyenler İin Yönergeler

DSM-5 Klinisyen Tarafından Puanlanan Otizm Spektrum ve Toplumsal İletişim Bozukluğu Şiddeti Ölçeđi bakım alan bireydeki 1) TOPLUMSAL İLETİŞİM ve 2) AZALMIŞ İLGİ ve TEKRARLAYICI DAVRANIŞ alanındaki zorluklara bađlı açığa çıkan işlevsellikteki azalmayı ve bireye sağlanması gereken destek düzeyini deđerlendiren 2 maddeli bir ölçektir. Ölçek tedavi planlanmasına ve prognostik karar vermeye yardımcı olabilmektedir. Ölçek klinisyen tarafından klinik deđerlendirme esnasında doldurulmaktadır.Klinisyenden birey tarafından son 7 gün boyunca deneyimlenen bu iki alandaki zorlukların neticesinde işlevsellikteki azalmanın ve gereken destek düzeyinin derecelendirilmesi istenmektedir.

Puanlama ve Yorumlama

Klinisyen Tarafından Puanlanan Otizm Spektrum ve Toplumsal İletişim Bozukluğu Şiddeti Ölçeđi'ndeki her bir madde 4-maddelik bir puan ile derecelendirilir.(Düzy 0=Hiç; Düzy 1=Hafif/Destek gerektirir; Düzy 2=Orta/Ciddi destek ihtiyacı ve Düzy 3=Yüksek/Çok ciddi destek ihtiyacı). Klinisyenden birey hakkındaki gerekli tüm bilgiyi gözden geçirmesi ve klinik kararı ile birlikte bireyin durumuna en çok uyan şiddet düzeyini seçmesi (ü) istenmektedir. Herbir madde için şiddet düzeyi ayrı olarak belirtilmelidir. Toplam şiddet düzeyi hesaplanmamalıdır.

Kullanım Sıklığı

Bireyin zaman içerisinde belirtilerinin şiddetinde meydana gelen deđişimleri izlemek amacı ile bireyin belirtilerinin stabilitesi ve tedavi durumuna bađlı olarak, klinik olarak gösterildiđi gibi düzenli aralıklar ile doldurulabilir. Bir alandaki ısrarlı yüksek puanlar, hasta için daha ileri deđerlendirme, tedavi ve takip gerektirebilecek kadar önemli ve sorunlu bir hastalığı gösterebilir. Klinik yargınız kararlarınızda yol gösterici olmalıdır.